


Lane Medical Library



ÜBER DIE CYTOARCHITEKTONIK UND HISTOLOGIE DER ZWISCHENHIRNBASIS BEIM HUND

INAUGURAL-DISSERTATION

FÜR ERLANGUNG DER MEDIZINISCHEN DOKTORWÜRDE
DER HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT
DER FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT
ERLANGEN

VORGELEGT VON

G. GRÖSCHEL
AUS NÜRNBERG

VERLAGS-DRUCKEREI AUGUST PRIES IN LEIPZIG

Erschienen in der
Deutschen Zeitschrift für Nervenheilkunde
Bd. 110 4/6

MEINEN LIEBEN ELTERN



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Einleitung.

Der Hypothalamus, welcher nach vergleichend anatomischen Studien als der phylogenetisch älteste Teil des Zwischenhirns zu zeichnen ist, stellt, wie die Forschung der letzten Jahrzehnte ergeben hat, eine übergeordnete Zentralstelle für die gesamte vegetative Regulation dar.

Die Erforschung dieser Gegend wurde zunächst mit rein anatomischen Untersuchungsmethoden in Angriff genommen. Hierbei wurde ein außerordentlich komplizierter Aufbau sowohl hinsichtlich der dort angeordneten Zellgruppen wie der in dieser Gegend verlaufenden Fasersysteme festgestellt. Gleichzeitig wurden vergleichend-anatomische Studien durchgeführt (Edinger).

Um die Funktion der subthalamischen Gebiete klarzulegen, standen im wesentlichen zwei Arbeitsmethoden zur Verfügung:

1. die pathologisch-anatomischen und
2. die experimentellen Untersuchungen.

Bei den klinischen und pathologisch-anatomischen Arbeiten handelt es sich hauptsächlich um Erkrankungen der Zwischenhirnbasis wie Tumoren oder Blutungen, die während des Lebens vegetative Störungen zeigten. So zeigten sich beispielsweise Tumoren im Bereiche des Tuber cinereum Störungen des Wasserhaushaltes im Sinne eines Diabetes insipidus oder des Fettstoffwechsels, die sich in einer Dystrophia adiposo-genitalis äußern. An weiteren bei Erkrankungen der Zwischenhirnbasis festgestellten vegetativen Störungen sind zu nennen: Glykosurie, Störungen der Wärmeregulation, Veränderungen der Schweiß-, Speichel- und Talgsekretion, Auftreten von Schlafsucht und schließ-

lich Störungen der Vasomotilität. Der Nachweis von pathologischen Veränderungen in der Zwischenhirnbasis bei den genannten vegetativen Störungen ließ darauf schließen, daß die im Hypothalamus gelegenen Zellgruppen übergeordnete Zentren für die Innervation vegetativer Funktionen beherbergen.

Beweisend für das Vorhandensein vegetativer Zentren sind die experimentellen Ergebnisse. Bekannt sind die Reizversuche am Zwischenhirn von Karplus und Kreidl. Dieselben erzeugten durch Reizung am Zwischenhirn von Hund und Katze in der Gegend des Corpus Luysii profuse Schweiß, oculo-pupilläre Symptome und allgemeine Vasokonstriktion. Die Tränen- und Speichelsekretion konnte gleichfalls beeinflusst werden. Die große Bedeutung des Tub. cinereum für den Wasserhaushalt und für die Wärmeregulation zeigen die experimentellen Befunde von Aschner, Leschke, Camus, Roussy, Beileý, Bremer u. a. Die Untersuchungen dieser Forscher ergaben eine Abhängigkeit des Kohlehydratstoffwechsels, des Eiweißumsatzes, des Fettansatzes und des Gesamtstoffwechsels von der Regulation der im Hypothalamus gelegenen Zellgruppen.

Die klinische wie experimentelle Untersuchung zeigte ferner eine innige und wechselseitige Beeinflussung der Hypophyse und der angrenzenden Teile des Zwischenhirns. Es ließ sich zeigen, daß eine Zellgruppe der Zwischenhirnbasis — der Nucl. supraopticus — Nervenfasern durch den Hypophysenstiel in den Hinterlappen der Hypophyse entsendet (R. Greving). Diese anatomisch festgelegte Tatsache läßt darauf schließen, daß die Sekretion des Hinterlappens der Hypophyse unter dem regulatorischen Einfluß der genannten Zellgruppe erfolgt, wodurch die Beziehung „Zwischenhirn-Hypophysensystem“, die man aus klinischen Tatsachen ableitete, ihre anatomische Sicherstellung erhielt.

Die experimentellen Untersuchungen werden meist in der Weise durchgeführt, daß in der Zwischenhirnbasis teils von oben, teils von unten her isolierte Stichverletzungen gesetzt und anschließend daran die etwa auftretenden vegetativen Störungen studiert werden. Für eine sichere Lokalisation der so erzeugten vegetativen Störungen in eine bestimmte Zellgruppe der Zwischenhirnbasis ist eine genaue Kenntnis des cystoarchitektonischen Aufbaues dieser Gegend notwendig. Für diese Versuche kommt außer dem Affen — der aus pekuniären Gründen meist nicht verwendet wer-

n kann — der Hund in Frage. Niederstehende Tiere der Wirbeltierreihe sind deshalb nicht so geeignet, weil diese schon eine wesentlich andere Struktur des Zwischenhirns als beim Menschen aufweisen und daher Analogieschlüsse auf dem Menschen nur schwer mit der genügenden Sicherheit zu ziehen sind. Da einsehende anatomische Untersuchungen der in Frage kommenden Zwischenhirnteile beim Hunde nicht vorliegen, schien es angezeigt, diese durchzuführen.

Es soll in vorliegender Arbeit bei normal anatomischen Verhältnissen näher auf die Zellstruktur der vegetativen Zentren im Hirnsbild eingegangen und die Topik weitgehend berücksichtigt werden. Die Frage hinsichtlich des Vorhandenseins der Tuberkerne beim Hund soll geklärt werden; denn dieselbe scheint noch nicht ganz eindeutig gelöst zu sein.

Bevor ich auf meine eigenen Untersuchungsergebnisse beim Hunde eingehe, seien unsere bisherigen Kenntnisse über die Cytoarchitektonik der Zwischenhirnbasis angeführt, soweit sie im Tuber cinereum gelegen sind.

Seit langer Zeit hat sich die Neurologie mit der Erforschung des Hypothalamus befaßt.

Von den im Tuber cinereum gelegenen Kernen ist am längsten der Nucl. supraopticus bekannt. Schon von Luys wird er beschrieben. Meynert bezeichnet die gleiche Zellenanhäufung als Ganglion opticum basale und schildert sie als sichelförmige, flache Zellgruppe, und zwar oberhalb und unmittelbar hinter dem Chiasma gelegen.

Lenhossék unterscheidet schon einen sich am weitesten vorschiebenden ovalen Kern, den Nucl. supraopticus und hinter der optikuskreuzung in der Hauptmasse des Tuber den Nucl. anterior; ferner beschreibt er die Corpora mammillaria und den nahe gelegenen Nucl. posterolateralis.

Kölliker und Cajal beschrieben das Tuber cinereum ziemlich einheitlich. Ersterer teilt den Nucl. supraopticus ein in einen vor dem Tractus gelegenen Nucl. supraopticus anterior, einen dorsal von ihm befindlichen Nucl. supraopticus dorsalis und einen zwischen den Tuberkernen liegenden Nucl. supraopticus posterior. Cajal trennt scharf den um den Tractus opticus gelegenen Nucl. supraopticus von den Tuberkernen und nimmt bei denselben eine

Dreiteilung vor. Als Noyau sousventriculäre bezeichnet er eine den III. Ventrikel begleitende, vertikal gestellte Zellgruppe.

Malone nimmt als orale Fortsetzung des Ganglion laterale corporis mammillaris den Nucl. mammillo-infundibularis an und benennt eine Zellsäule, die parallel dem Rande des III. Ventrikels verläuft, als Nucl. paraventricularis.

Friedemann bestätigt diese Kerne und fügt einige Zellenhäufungen im Tubergrau als T α , T β , T γ hinzu; doch faßt er nicht Zellen mit gleicher Struktur zu Kerngruppen zusammen, sondern grenzt enger beisammenliegende Zellen als eigene Zellkerne ab. Er stellt sich dadurch in einen Gegensatz zu Malone.

Die grauen Massen, welche um den Boden des III. Ventrikels gelegen sind, werden beim Menschen und bei Säugetieren von Spiegel und Zweig näher beschrieben und einzelne Kerne, wie Nucl. tuberis, Nucl. suprachiasmaticus, perifornicale Gruppen, diffuses Tubergrau darin abgegrenzt.

Die genaue Cytoarchitektonik des Tuber cinereum und Histologie der Tuberkerne findet sich in „Das zentrale Nervensystem“ von R. Greving im „Handbuch der Mikroskopischen Anatomie des Menschen“. An Kernen werden hier folgende unterschieden und histologisch näher beschrieben:

Substantia grisea centralis.

Nucl. supraopticus.

Nucl. paraventricularis.

Nuclei tuberis.

Nucl. mammillo-infundibularis.

Nucl. pallido-infundibularis.

Nucl. interfornicatus.

Auch von O. Gagli sind die oben genannten Kerne beim Menschen eingehend beschrieben.

Methodik.

Es wurden Gehirne von jungen Hunden sogleich nach dem Tode in 96 proz. Alkohol fixiert, nachdem vorher der Stirnpol gekappt wurde, um ein Eindringen des Fixiermaterials in die Seitenventrikel zu ermöglichen. Die entsprechenden Blöcke wurden in Zelloidin eingebettet und Serien von 20 μ Dicke hergestellt. Die Schnitte wurden mit Thionin gefärbt, bis zur Dampfbildung er-

ärmt, in destilliertem Wasser und in 70proz. Alkohol abgespült. Daraufhin wurden die Präparate noch kurz durch absolutem Alkohol und Xylol gezogen und auf den Objektträger gebracht.

Zum Studium standen Frontalserien der Zwischenhirne von Hunden zur Verfügung.

Im folgenden sollen zunächst die topischen Verhältnisse der Zwischenhirnkerne dargelegt und dabei von oral nach kaudal in Frontalschnitten fortgeschritten werden.

Auf einem Schnitt, der vor dem Chiasma opticum gelegt ist, sieht man an der Basis des Gehirns liegend die beiden Nervi optici. Von den Stammganglien tritt deutlich der Nucl. caudatus und das Putamen — getrennt durch die Capsula interna — hervor. Median treffen wir das Septum pellucidum begleitet von Streifen dichtgelagerter großer Zellen, die zur Gehirnbasis ziehen. Sonst sind sichtbar das Corpus callosum und die beiden Seitenventrikel.

Ein Schnitt ungefähr in der Mitte des Chiasma läßt ähnliche Verhältnisse erkennen.

Wird dagegen ein solcher unmittelbar hinter der Optikuskreuzung durch die oralen Gebiete des Tuber cinereum gelegt, so ergibt sich folgendes Bild:

Die mächtig entwickelte Capsula interna wird medial vom Nucl. caudatus und Thalamus, lateral vom Nucl. lenticularis begrenzt. Nach dem Verschwinden des Septum pellucidum haben sich die Crura fornicis dem Corpus callosum dorsalwärts angelagert. Die vordere Kommissur erscheint deutlich. In der Mitte befindet sich der III. Ventrikel, dessen Boden das Tuber cinereum bildet; letzteres wird lateral von den Tractus optici begrenzt. Das ganze Tubergrau ist von Zellmassen ausgefüllt, von denen drei große Gruppen zu unterscheiden sind:

- die Substantia grisea centralis,
- der Nucl. supraopticus und
- der Nucl. paraventricularis.

1. Cystoarchitektonik.

Bei einem Schnitt durch die vordere Chiasmagegend ergibt sich folgender Aufbau der Zellkerne (Abb. 1):

Um den III. Ventrikel herum, besonders zu beiden Seiten und am Boden desselben sind massenhaft dichtgelagerte kleine Zellen




Abb. 1.




Abb. 2.

zutreffen, die man als die Substantia grisea centralis zusammenfaßt. Ziemlich gleichmäßig verteilt finden sie sich dicht unter dem Endothel des III. Ventrikels. An einzelnen Stellen kommt es jedoch zu stärkeren Ansammlungen der kleinen Zellen, daß der Eindruck erweckt wird, als handele es sich um besondere Kerne.

Oberhalb und lateral vom Chiasma (Abb. 1 u. 2) liegt der





Abb. 3.


Nucl. supraopticus. Die Zellen sind bedeutend größer als jene des zentralen Höhlengrau, liegen dichter beisammen und der Zellkern hat auf Abb. 1 u. 2 diejenige Gestalt, die von den Autoren als halbmondförmig, sichelförmig und dreieckig bezeichnet worden ist.

Legt man den Schnitt durch die kaudalen Teile des Chiasma (Abb. 3 u. 4), so findet man am Boden des III. Ventrikels, dicht an das Chiasma anschließend, zwei nach dorsal sich verjüngende



Nucl.
para-
ventri-
cular

Abb. 4.



Nucl.
paraventricularis

Abb. 5.

Zellsäulen, parallel den Ventrikelwänden verlaufen und aus Zellen des zentralen Höhlengrau bestehen. Dicht oberhalb dieser Zellsäulen tritt ein anderer Zellkern, der Nucl. paraventricularis auf, der dichter an den Wandungen des III. Ventrikels liegt und nur durch eine schmale zellarme Zone vom Epithelium getrennt ist; ebenfalls parallel zum III. Ventrikel verläuft





Abb. 6.


ne Zellgruppe, die keulenförmige Gestalt hat und sich aus mittelgroßen Zellen zusammensetzt. Der Nucl. supraopticus ist weiter als laterale Ende des Chiasma gerückt und bedeutend kleiner geworden.

Geht der Schnitt unmittelbar hinter dem Chiasma (Abb. 5 u. 6) durch, so fällt jetzt der Nucl. paraventricularis besonders durch seine deutlich ausgeprägte Form und durch seine bedeutende oralwärts gerichtete Lageverschiebung auf. Das zentrale Höhlen-

grau zeigt nichts Besonderes; vom Nucl. supraopticus ist nur noch eine schmale Zelleiste sichtbar.



Hypophysenstiel
Abb. 7.



Nucl.
supra-
opticus

Abb. 8.

Ein Schnitt durch die Hypophysengegend (Abb. 7, 8 u. 9) läßt am Hypophysenstiel deutlich den nervösen und drüsigen An-





Abb. 9.

teil erkennen (Abb. 9). Im zentralen Höhlengrau sind wiederum einige Anhäufungen von Zellen zu sehen. Ganz medial vom Tractus opticus liegt der Nucl. supraopticus.

Werden von einem Schnitt die kaudalen Teile des Tuberculum getroffen (Abb. 10), dann findet man an den basalen Gegen-



Gegend
des
Nucl.
tuberis

Abb. 10.

den desselben die gut ausgeprägte Zellgruppe des Nucl. mamilloinfundibularis. Verstreut in dem ziemlich eintönigen Höhlengrau liegen ganz vereinzelt etwas größere Zellen, die zu den Nuclei tuberculi zu rechnen sind und sich an verschiedenen Stellen zu kleinen Zellanhäufungen zusammenschließen (Abb. 10).

2. Histologie.

Substantia grisea centralis (Abb. 11).

Nach der Nisslfärbung erkennt man an der Zelle des zen-




Abb. 11. Zellen aus dem zentralen Höhlengrau.

tralen Höhlengraus einen verhältnismäßig großen, meist ovalen Zellkern mit Kernkörperchen- und Zellmembran. Umgeben ist der Zellkern von einem schmalen Protoplasmasaum mit staubförmiger Nisslgranula und vereinzelt aufgelagerten Schollen. Die äußere Zellform dieser kleinsten Zellen des ganzen Zentralnervensystems ist wechselnd. Sie ist uni-, bi- und tripolar mit langen aus den

Zellkörper langsam hervorgehenden Fortsätzen. Deshalb ist die Keulenform die häufigste Art des Vorkommens. Die Anordnung der Zellen zueinander ist ohne bestimmte Gesetzmäßigkeit.

Nucl. supraopticus (Abb. 12 u. 13).

Die Zellen des Nucl. supraopticus haben einen runden Zell-





Abb. 12 u. 13. Zellen aus dem Nucleus supraopticus.

rn mit gut sichtbarem Kernkörperchen und Zellmembran. Um
n Kern schmiegt sich eine ziemlich breite Zone feinstaubiger
Nisslgranula an, während an der Peripherie grobe, stark gefärbte
Nisslschollen angehäuft sind, in welchen sich häufig an Vakuolen
innernde Aufhellungen zeigen. Die äußere Zellform dieser mittel-
großen Zellen ist rundlich, oval, birnförmig oder dreieckig; sie ist
meist unipolar oder hat 2—3 kurze gedrungene Fortsätze.

Nucl. paraventricularis (Abb. 14).

Durch die Tatsache, daß die Zellen des Nucl. paraventricu-
laris in Größe, Form und Färbbarkeit denen des Nucl. supra-
opticus fast vollkommen gleichen, macht es natürlich erhebliche




Abb. 14. Zellen aus dem Nucleus paraventricularis.




Abb. 15. Zellen aus dem Nucleus tuberis.

Schwierigkeiten zu entscheiden, wohin eine zwischen beiden Kernen
gelegene Zellgruppe zu rechnen ist. Im Zellgebiet des Nucl. para-
ventricularis findet man häufig Zellen von verschiedener Größe.

Nuclei tuberis (Abb. 15).

Die Zellen selbst sind mittelgroß — kleiner als jene vom
Nucl. supraopticus und Nucl. paraventricularis — liegen dichter
 beisammen; sie sind drei- oder viereckig mit bis zu vier Fortsätzen.
 Letztere sind auf der Abbildung deutlich sichtbar. Die Zelle be-
 sitzt einen Zellkern mit Kernkörperchen und Zellmembran. Im
 mittelbreiten Protoplasmasaum ist feinstaubige Nisslgranula und
 lipoidpigment eingelagert. Im Vergleich zu den vorher beschrie-
 benen Zellen sehen letztere etwas verwaschen aus.

Ergebnisse.

Die Zellansammlungen des zentralen Höhlengrau führen dazu, daß sie von vielen Autoren als Kerne benannt worden sind. So z. B. teilte Malone die gesamte graue Bodenmasse in eine Pars superior und Pars inferior ein. Die Friedemannschen Konzentrationskerne und der von Spiegel und Zweig beschriebene Nucl. suprachiasmaticus sind auf solche Zellanhäufungen zurückzuführen. Eine besondere Abtrennung oder Benennung dieser Zellansammlungen läßt sich nicht aufrechterhalten, da an den Zellen morphologisch keine Unterschiede festzustellen sind (R. Greving 1922). In vorliegenden Präparaten sind Zellansammlungen solcher Art mehrfach zu sehen, besonders auf Abb. 3 dorsal vom Chiasma gelegen.

Der Nucl. supraopticus ist ungefähr 4,16 mm lang; in seiner Mitte am breitesten (2,2 mm) und an dieser Stelle ganz nahe am Chiasma angrenzend 0,6 mm hoch (dorsalwärts).

40 Schnitte kaudalwärts nach Beginn des Chiasma sieht man an der Gehirnbasis liegend — etwa 2 mm lateral vom III. Ventrikel entfernt — einige mittelgroße dichtgelagerte Zellen liegen. Dies ist der Anfang vom Nucl. supraopticus. Allmählich nehmen diese Zellen an Zahl zu, bleiben als schmale Leiste an der Gehirnbasis und erreichen schließlich den lateralen Rand des Chiasma. Weiter kaudalwärts bemerkt man, wie die Zellenzahl sich in der Mitte dieser Leiste vermehrt und an jener Stelle bei folgenden Schnitten eine Vorwölbung bildet. Letztere wandert dann medianwärts bis zum Chiasma und jetzt hat der Nucl. supraopticus jene halbmondförmige Gestalt bekommen. Noch weiter kaudal nimmt der Kern an Größe ab, gibt seine Abgeschlossenheit auf, vereinzelt Zellnester werden in das zentrale Höhlengrau vorgeschoben und können noch einige Zeit verfolgt werden. In demselben Maße wie dieser Kern sich oral von einigen Zellen langsam bis zu seiner größten Form entwickelt hat, wird er kaudal zusehends kleiner und verschwindet ganz.

Von seinem Ende an. 32 Schnitte kaudalwärts tritt wieder eine Zellgruppe medial vom Tractus opticus auf, die nach der Lage, Form und Färbbarkeit der Zellen zum Nucl. supraopticus zu rechnen ist. Diese Zellansammlung verliert sich dann im zentralen Höhlengrau. Jedenfalls handelt es sich um die Pars ventro-

medialis des Nucl. supraopticus (R. Greving 22). Eine strenge Einteilung wie sie sich beim menschlichen Gehirn vorfindet: in die Pars dorso-lateralis, eine Pars dorso-medialis und eine Pars latero-medialis konnte nicht festgestellt werden.

Der Nucl. paraventricularis mit seiner auf dem Schnitt erscheinenden Keulenform ist 4,48 mm lang, 1,86 mm hoch und 1,6 mm breit.

Er liegt zu beiden Seiten des III. Ventrikels und vom Endothel desselben nur durch eine schmale zellarme Zone getrennt. Dorsalwärts reicht der Kern nicht soweit wie die Nucl. supraopticus. Er beginnt 68 Schnitte später als der Nucl. supraopticus mit einer massigen Zellanhäufung, welche dicht über dem Boden des III. Ventrikels liegt. Der Kern bildet sich zu einer keulenförmigen Zelle aus, deren dickeres Ende anfangs der Zwischenhirnbasis, weiter dorsal gerichtet ist. Eine Lageveränderung macht er insofern durch als er sich allmählich von der Basis dorsalwärts entfernt und sich so der Commissura intermedia nähert. Der Kern ist an seiner Form sehr gut zu erkennen, jedoch läßt er sich gegen seine Umgebung nicht so scharf abgrenzen, denn Zellen von seiner Umgebung liegen ziemlich zerstreut im zentralen Höhlengrau; besonders finden sich kleine Zellnester in Richtung gegen den Nucl. supraopticus.

Im mittleren Gebiete des Tuber cinereum treten die Nuclei subpretectalis auf. Medial werden dieselben begrenzt von der grauen Substanz des III. Ventrikels, lateral von den Hirnschenkeln und dorsal vom Fornix. Beim menschlichen Gehirn können deutlich drei Zellgruppen unterschieden werden. In vorliegenden Präparaten erkennt man wohl in oben genauer bezeichneten Gebieten Ansammlungen von kleinen verstreut liegenden Zellanhäufungen, die auch den Eindruck der Zusammengehörigkeit machen. Streng genommen kann man jedoch von Tuberkernen im Sinne der anderen vegetativen Kerne im Zwischenhirn des Hundes nicht sprechen.

Zum Schlusse dieser Abhandlung ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. R. Greving, für die freundliche Überlassung der Arbeit und für die zahlreichen Anregungen dazu meinen ergebenen Dank auszusprechen.

Literatur.

Aschner, B., Technik der experimentellen Untersuchungen an der Hypophyse und am Zwischenhirn. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Teil 3B, H. 2. — Cajal, R. Y., Histologie du système nerveux. Paris 1911. Edit. franç. — Camus und Roussy, Local. anatomique des lésions de la base du cerveau qui provoquent la polyurie. Compt. rend. des séances de la soc. de biol. 1913, Bd. 75. — Edinger, Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentralorgane. I. u. II. Teil. — Friedemann, M., Die Cytoarchitektonik des Zwischenhirns der Cercopitheken mit besonderer Berücksichtigung des Thalamus opticus. Journ. f. Psychol. u. Neurol. 1911, Bd. XVIII. — Gagel, O., Zur Topik und feineren Histologie der vegetativen Kerne des Zwischenhirns. Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 87, H. 5 u. 6. — Greving, R., Das Zentralnervensystem. Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen. — Derselbe, Die Erkrankungen des vegetativen Nervensystems. Lehrbuch der Nervenkrankheiten. — Derselbe, Beitrag zur Innervation der Hypophyse. Vortr. i. d. phys. med. Soz. Erlangen am 30. VII. 1925. Klin. Wochenschr. 1925, Nr. 4, S. 2181. — Derselbe, Beiträge zur Anatomie der Hypophyse und ihrer Funktion. I. Eine Faserverbindung zwischen Hypophyse und Zwischenhirnbasis (Tr. supra-optico-hypophyseus). Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 1926, Bd. 89, S. 179-195. II. Das nervöse Regulationssystem des Hypophysenhinterlappens (der Nucleus supraopticus und seine Fasersysteme). Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 1926, Bd. 104, H. 3, S. 466-479. — Kary, C., Pathologisch-anatomische und experimentelle Untersuchungen zur Frage des Diabetes insipidus und der Beziehungen zwischen Tubercinereum und Hypophyse. Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. 1924, Bd. 252. — Karplus und Kreidl, a) Über Störungen der Schweißsekretion bei Verwundungen des Nervensystems. — b) Gehirn und Sympathicus. I. bis IV. Mitt. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 1909, Bd. 29, S. 138; 1910, Bd. 135, S. 401; 1912, Bd. 143, S. 109. — Kölliker, A., Handbuch der Gewebelehre, Bd. II. — Leschke, a) Einfluß des Zwischenhirns auf die Wärmeregulation. Zeitschr. f. exp. Pathol. u. Therapie 1913, Bd. 14. — b) Die Wirkung des Hypophysenextraktes. Biochem. Zeitschr. 1919, Bd. 96. — c) Beiträge zur klinischen Pathologie des Zwischenhirns. I. Diabetes insipidus. Zeitschr. f. klin. Med. 1919, Bd. 87. — d) Zur klinischen Pathologie des Zwischenhirns. Verhandl. d. dtsch. Kongr. f. inn. Med. 1920. — Lenhossék, Anat. Anzeiger 1887. — Luys, Recherches sur le système nerveux cerebrospinal. 1865. — Malone, Über die Kerne des menschlichen Diencephalon. Abhandlungen der Preuß. Akademie der Wissenschaften 1910. — Meynert, Th., Strickers Handbuch der Gewebelehre 1872, Bd. II. — Spiegel, E. A., und H. Zweig, Zur Cystoarchitektonik des Tubercinereum.

Lebenslauf.

Am 4. April 1899 wurde ich in Nürnberg geboren. Meine erste Schul- und Mittelschulbildung erhielt ich ebenfalls dort. Von der Schule aus trat ich am 15. März 1917 für kurze Zeit zum Kriegshilfsdienst und anschließend daran als Fahnenjunker in das Heer ein. Nach dem Kriege leistete ich noch ein halbes Jahr Dienst bei der Reichswehr. Vom Beginn des Wintersemesters 1920 studierte ich Medizin an den Universitäten zu Erlangen, München, Wien und Würzburg. In Erlangen bestand ich mein Physikum und Staatsexamen. Seit 10. Januar 1928 bin ich Medizinalassistent an der Erlanger Medizinischen Klinik.

